


E-LACTANCIA		
Fenilcetonuria	Mixta con leche sin fenilalanina (no tomar aspartamo, leche fórmula antes que pecho, medir niveles de F.A. en suero frecuentemente).	
Leucinosis o de orina de jarabe de arce	Mixta con leche sin leucina, isoleucina y valina.	
CAV AEPED 2018	Citomegalovirus	Pasa virus y defensas.
	Hep A	Ig. estándar + vacuna (si infección < de 15 días). Lavado de manos 3-4 semanas evitar fecal-oral.
	Hep B	Ig. anti B + vacuna en primeras 12 h.
	Hep C	Riesgo perinatal títulos ARN del VHC↑ + VIH → no por la leche.
	Varicela (5 pre-48 post)	Ig. estándar o anti varicela y vigilar.
	Tuberculosis	Isoniazida (calcular a la baja pues pasa leche materna) al lactante 6 meses si <15 días antes del parto (retrasar 15 días contacto).

**DESTETE** El destete definitivo es una decisión personal, a iniciativa de la madre o de la criatura. Es preferible un destete gradual a un destete brusco.

### SUPRESIÓN DE LA LACTANCIA



### EDUCACIÓN SANITARIA

<b>EPS en LM para profesionales de la salud</b>	Conocimiento, habilidades y actitudes para conseguir hábitos de vida saludables.
	Reacciones ante las consecuencias del abandono de la lactancia materna: <ul style="list-style-type: none"> <li>Diez pasos hacia una feliz lactancia materna (iniciativa IHAN Hospitales). Siete pasos en Centros de Salud IHAN.</li> <li>Código Internacional de Comercialización de Sucedáneos de leche materna.</li> </ul>
<b>EpS en LM para mujeres gestantes o lactantes y sus familias</b>	Ayudaremos a las madres a iniciar la lactancia durante la media hora siguiente al parto, inmediatamente o lo antes posible, y mostraremos a las madres cómo se debe dar de mamar al niño y cómo han de mantener la lactación, incluso si han de separarse de sus hijos.